







## Abweichungen vom aktuellen Klima

Dargestellt sind Mittel des ÖKS15-Ensembles

### hohe Anstrengungen im Klimaschutz (RCP4.5)



### geringe Anstrengungen im Klimaschutz (RCP8.5)



0 25 50 km

2016-2045

2036-2065

2071-2100



## Beschreibung

Diese Karten zeigen die Anzahl der Tage im Jahr in der Steiermark, an denen Frost und Tau innerhalb eines Tages vorkommen. Gezählt werden jene Tage, an denen die Tagesminimum-Temperatur kleiner gleich  $-2,2^{\circ}\text{C}$ , sowie die Tagesmaximum-Temperatur größer gleich 0 ist. Zu sehen ist jeweils das Mittel dieser Anzahl über die angegebene Periode.

Die Karten zeigen die Entwicklung der Frost-Tau-Wechseltage im Laufe des 21. Jahrhunderts, und zwar für die Perioden 2016-2045, 2036-2065 und 2071-2100. Die obere Reihe zeigt diese Entwicklung unter Annahme hoher Anstrengungen im Klimaschutz (RCP4.5), die untere Reihe unter Annahme geringer Anstrengungen im Klimaschutz (RCP8.5). Es werden jeweils die Änderungen gegenüber dem Beobachtungszeitraum (aktuelles Klima, 1981-2010) dargestellt.

#### Indikatorberechnung und GIS-Bearbeitung

Benedikt Becsi, Johannes Laimighofer  
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Meteorologie  
meteorologie@boku.ac.at

#### Datenquellen

Spartacus (ZAMG, Hiebl et al. 2015) | Gpard (ZAMG, Hofstätter et al. 2016)  
ÖKS15 (Uni Graz, Wegener Center, Leuprecht et al. 2016)

#### Design

awdesign.at

Alle Daten und Informationen  
sind unter  
[data.ccca.ac.at/climamap](http://data.ccca.ac.at/climamap)  
frei verfügbar!

## Aktivitätsfelder

